

Prélèvements microbiologiques : Infections Génitales Hautes

Prélèvement vaginal après pose de spéculum et endocol après nettoyage de la glaire cervicale

Prélever à l'aide de l'écouvillon et le casser dans le milieu de transport adéquat

Recherche de **bactéries** ou de **levures**

2 écouvillons **bouchon rose**

Prélèvement :

- **cul de sac vaginal + endocol**
- bien différencier les 2 sites de prélèvement sur l'étiquette
- bien cocher les 2 demandes (cul de sac vaginal + endocol) sur le bon de demande



X2

Recherche de **Chlamydiae**, **Gonocoque** et/ou **Mycoplasma genitalium**

1 écouvillon **bouchon orange**
+1 écouvillon **bouchon violet** si demande de *M.genitalium*

Prélèvement :

- **Endocol** uniquement
- préciser en toutes lettres la demande de *M. genitalium* (sinon examen non réalisé)



Recherche de **HSV**
Uniquement si lésions suspectes

1 écouvillon

bouchon rouge

Prélèvement des lésions

Et cocher la case « Herpès » ci-dessous



Suspicion d'IGH = 4 écouvillons

1 seul sachet transparent

1 seul bon « Microbio 2 » en précisant le CONTEXTE

(G) Génitaux IST : Femme

Bactériologie/Mycologie

- | | |
|------|--|
| BGVA | ☒ Cul de sac vaginal |
| BMAP | ☐ Cul de sac en cas de RPM ou MAF |
| BGCO | ☒ Endocol |
| BGLD | ☐ Lochies |
| BGST | ☐ Stérilet |
| BGVU | ☐ Vulve |
| BGLP | ☐ Liquide pelvien sous coelio |
| BGUG | ☐ Ulcération génitale |

Virologie

- | | |
|------|--|
| VHSB | ☐ Herpès |
| VHPC | ☐ Papilloma virus |

Chlamydia / Gono

- | | | |
|--------------|--|--------------------------------|
| COL+PCRCTNG | ☒ Endocol | + Mycoplasma genitalium |
| STE+PCRCTNG | ☐ Stérilet | |
| LPEL+PCRCTNG | ☐ Liquide pelvien sous coelio | |
| CDS+PCRCTNG | ☐ Auto prélèvement vaginal | |
| MAN+PCRCTNG | ☐ Marge anale | |