Molécules du <u>panel Toxiques</u>		**Tmax**	**T1/2**	**Détection dans le sang**	**Détection dans l'urine**	**Commentaire**
Cannabis	THC et métabolite THC-COOH	7-8 min (inhalation)	3.8 h (THC) 24-72 h (THC-COOH)	15 min à 6h Selon le mode de consommation	1 à 30 j Seloin le mode de consommation	Très lipophile=> relargage
Cannabinoïdes de synthèse	UR-A44 JWH-018 AB-PINACA AB-CHMINACA			3 à 48 h Selon les produits	72h	Nombreux produits disponibles
Opiacés	Morphine		2-3 h	6 à 12 h	24 à 48 h	
	Codéine		2,5 h	8 h	24 à 48 h	
	Pholcodine		45 h	48 à 72 h	11 à 20 j	
	6-MAM		30 min	< 6 h	< 12h	Métab Héroïne. Instable Rendu avec Opioïdes
Opioïdes	Tramadol		5-7 h 6-10 h (ODMT)	12 à 24 h 60h si patch de fentanyl	48 à 72 h	
	Oxycodone		2-3 h			
	Fentanyl					
Produits substitution Opiacés	Méthadone		8-30 h	24 à 48 h	3 à 7 j	
	Buprénorphine		40 min	4-6 h	24 à 48 h	
Cocaïne	Benzoylecgonine	2-3 min en sniff 1 h PO	40 min	< 24 h	48 à 72 h	
Amphétaminiques	Amphetamine		7-35 h	< 8 h	24-72 h	Elimination favorisée par un pH acide
	Ecstasy		7-12 h	6 à 12 h	24 à 48 h	
Cathinones	Alpha PVP					Nombreux produits disponibles
Hallucinogènes	Phencyclidine (PCP)			< 24 h	48 à 72 h	Effets en qq min ; durée qq heures
Ethylglucuronide					5 j	

Issu de SCHULZ M et col ; Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 1,100 drugs and other xenobiotics. Critical Care 2020
et Kintz P ; Elsevier 1998 Toxicologie et Pharmacologie Médicolégales